

تحليل البول

تعليمات جمع العينات

حاوية	<p>حاوية بلاستيكية معقمة مع حامل الأنبوب كما هو موضح في الشكل:</p> 
الطريقة	<p>يجب أن يتم جمع العينة في صباح يوم تسليم العينة، بحيث يتم جمع البول بعد ساعتين على الأقل من آخر عملية تبول. يجب إكمال أي علاج بالمضادات الحيوية قبل 7 أيام على الأقل من إجراء الفحص.</p> <ul style="list-style-type: none">• اغسل الأعضاء التناسلية بعناية بالماء والصابون (في الإناث، ابق الشفرين الكبيرين منفصلين أثناء التبول؛ وفي الذكور، اسحب جلد الحشفة بالكامل) وقم بالتجفيف بعناية باستخدام ورق يمكن التخلص منه.• افتح الحاوية المعقمة، مع الحرص على وضع الغطاء باتجاه الأعلى على سطح نظيف ودون ملامسة الجزء الداخلي للوعاء والغطاء.• تخلص من البول الأول (مجرى البول الأول) واجمع البول المتوسط (مجرى البول الثاني) في الحاوية.• إذا كان أنبوب الاختبار متاحًا، قم بإزالة الملصق من الحاوية (الصورة 1) وأدخل أنبوب الاختبار بحيث يكون الغطاء الأصفر متجهًا للأسفل، مع الضغط بقوة (الصورة 2). يتدفق البول تلقائيًا إلى الأنبوب، انتظر حتى يمتلئ الأنبوب. قم بإزالة الأنبوب ورجه بلطف (الصورة 3). ضع أنبوب الاختبار في الظرف لتسليمه إلى مركز الاختبار (الصورة 4)  <ul style="list-style-type: none">• إذا لم يكن لديك أنبوب الاختبار، أغلق الحاوية بعناية، دون لمس الجزء الداخلي من الغطاء وضعها في كيس النقل.
التخزين	<p>قم بتسليم الحاوية/الأنبوب إلى مركز التجميع خلال ساعات العمل وخلال ساعتين من التجميع.</p>
ملاحظات	<p>اتبع الطرق الموضحة. ملاحظة: قد يتم إجراء بعض الاستثناءات بناءً على إشارة الطبيب الذي يعطيك الوصفة.</p>

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
27/12/2023	Raccolta_Campioni_Microbiologici_Utenti (DI 2779)	06/02/2024	01	6 di 19