


تحليل السائل المنوي

تعليمات التحضير لأخذ العينات

حاوية	<p>حاوية بلاستيكية معقمة مع غطاء مسماري.</p> 
الطريقة	<p>إذا تم طلب اختبار تحليل البول أيضًا في نفس الوقت، فمن الضروري جمع عينة البول أولاً ثم السائل المنوي. الامتناع عن الجماع ليس ضرورياً. يجب إكمال أي علاج بالمضادات الحيوية قبل 7 أيام على الأقل من إجراء الفحص.</p> <p>تنبيه: إذا تم طلب مسحة مجرى البول أيضًا في نفس الوقت، فمن الأفضل أن يتم إجراؤها في يوم مختلف عن يوم جمع السائل المنوي و/أو البول. إذا لم يكن ذلك ممكناً، يجب أن تمر ساعتين على الأقل بين مسحة مجرى البول وجمع السائل المنوي و/أو البول.</p> <p>جمع السائل المنوي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اجمعها في الصباح الباكر • قم بتنظيف الأعضاء التناسلية بعناية عن طريق سحب جلد الحشفة وشطفها جيداً بالماء الجاري • التبول لإزالة النباتات الرمية (الكائنات الحية الدقيقة الموجودة عادة) من قناة مجرى البول. إذا تم بالفعل جمع منتصف البول (التيار الثاني من البول) لتحليل البول، فتجاهل هذه الخطوة • ابدء بجمع الحيوانات المنوية بالاستمنا • قم بجمع السائل المنوي مباشرة في الحاوية المعقمة • أغلق الغطاء عن طريق ربطه بعناية
التخزين	<p>قم بتسليم عينة السائل المنوي (وربما أيضاً عينة تحليل البول) خلال ساعة واحدة من جمعها؛ إذا لم يكن ذلك ممكناً، قم بتخزين العينة في الثلاجة عند درجة حرارة 4 درجات مئوية حتى التسليم.</p>

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
27/12/2023	Raccolta_Campioni_Microbiologici_Utenti (DI 2779)	06/02/2024	01	14 di 19