

البحث عن مستضدات البراز لـ: الملوية البوابية ، الفيروس الغدي ، فيروس الروتا، المطثية العسيرة

تعليمات جمع العينات

حاوية	<p>حاوية بلاستيكية مع غطاء لولبي ومغرفة داخلية.</p> 
الطريقة	<ul style="list-style-type: none"> • اجمع البراز على سطح جاف ونظيف (مقلاة السرير، قطعة من الورق أو كيس من البلاستيك يمكن وضعها في البيديه، في وعاء أو تحت مقعد المراض) (ملحوظة: لا تلوث البراز بالبول ومياه المراض (لا تجمع البراز مباشرة من المراض)) • أمسك الحاوية في وضع عمودي، وقم بنقل كمية صغيرة من المادة البرازية باستخدام ملعقة صغيرة موضوعة تحت الغطاء أو باستخدام ملعقة نظيفة.
التخزين	<p>قم بتسليم الحاوية إلى مركز التجميع خلال ساعات العمل. يمكن تخزين العينة في الثلاجة عند درجة حرارة 4 درجات مئوية لمدة تصل إلى 48 ساعة.</p>
ملاحظات	<p>متطلبات إجراء اختبار (الملوية البوابية):</p> <ul style="list-style-type: none"> • لاختبار مستضد الملوية البوابية ، من الضروري الانتهاء من العلاج بالمضادات الحيوية لاستئصالها لمدة 30 يومًا على الأقل. • يجب أيضًا إيقاف استخدام الأدوية الوقائية للمعدة لمدة 7 أيام على الأقل.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
27/12/2023	Raccolta_Campioni_Microbiologici_Utenti (DI 2779)	06/02/2024	01	13 di 19