

تحليل البول من القسطرة الدائمة

تعليمات جمع العينات

<p>حاوية</p>	<p>حاوية بلاستيكية معقمة مع حامل الأنبوب كما هو موضح في الشكل:</p> 
<p>الطريقة</p>	<ul style="list-style-type: none"> • يجب الانتهاء من أي علاج بالمضادات الحيوية قبل 7 أيام على الأقل من إجراء الفحص. • قم بإغلاق وسد أنبوب التوصيل بين القسطرة والكيس مباشرة أسفل الوصلة مع القسطرة لمدة نصف ساعة على الأقل قبل أخذ العينة. • اغسل يديك وارتي قفازات يمكن التخلص منها. • قم بتطهير صمام أخذ العينات الخاص بالقسطرة، واترك المطهر حتى يجف ثم اسحب منه مباشرة بحقنة معقمة. ضع البول في الوعاء المعقم. • إذا كان أنبوب الاختبار متاحًا، قم بإزالة الملصق من الحاوية (الصورة 1) وأدخل أنبوب الاختبار بحيث يكون الغطاء الأصفر متجهًا للأسفل، مع الضغط بقوة (الصورة 2). يتدفق البول تلقائيًا إلى الأنبوب، انتظر حتى يمتلئ الأنبوب. قم بإزالة الأنبوب ورجه بلطف (الصورة 3). ضع أنبوب الاختبار في الظرف لتسليمه إلى مركز الاختبار (الصورة 4).  <ul style="list-style-type: none"> • إذا لم يكن لديك أنبوب الاختبار، أغلق الحاوية بعناية، دون لمس الجزء الداخلي من الغطاء وضعها في كيس النقل. <p>ملحوظة: لا تأخذ من حقيبة التجميع أبدًا؛ لا تقم بفصل القسطرة.</p>
<p>التخزين</p>	<p>قم بتسليم الحاوية/الأنبوب إلى مركز التجميع خلال ساعات العمل وخلال ساعتين من التجميع.</p>
<p>ملاحظات</p>	<p>اتباع الطرق الموضحة. ملاحظة: قد يتم إجراء بعض الاستثناءات بناءً على إشارة الطبيب الذي يعطيك الوصفة.</p>

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
27/12/2023	Raccolta_Campioni_Microbiologici_Utenti (DI 2779)	06/02/2024	01	7 di 19