

HISOPADO VAGINAL / CERVICAL / URETRAL y VAGINO-RECTAL (EN EL EMBARAZO DE LA SEMANA 35^a A LA 38^a) Instrucciones para prepararse a la extracción

MODALIDAD	<p>Información importante para la preparación a realizar en casa antes de la recogida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No estar en tratamiento con antibióticos, o haber suspendido el tratamiento al menos 7 días antes. • Abstenerse de tener relaciones sexuales durante los tres días que preceden al examen. • No introducir ningún tipo de medicamento en la vagina (óvulos, aplicadores, cremas, etc.) • No realizar duchas vaginales internas. • No aplicar medicamentos para las hemorroides. • La prueba debe realizarse en días alejados del flujo menstrual (al menos 3-4 días antes del inicio o después del final). • Lavar el área genital minuciosa y repetidamente con agua y jabón. • Enjuagar con agua corriente y secar con papel desechable.
	<p>CUANDO TAMBIÉN SE REQUIERE EL HISOPADO URETRAL, NO ORINAR POR LO MENOS DURANTE DOS HORAS ANTES DE LA HORA DE LA CITA</p>
	<p>Normalmente, la búsqueda de patógenos de transmisión sexual (<i>Clamidia</i>, <i>Micoplasmas</i>, <i>Tricomoniasis</i>, etc.) se realiza mediante un hisopado cervical/vaginal. Si se requiriese la búsqueda de estos patógenos en la <u>orina</u>, asegurarse de recoger la primera micción (PRIMER CHORRO) de la mañana y en todo caso la orina que haya permanecido en la vejiga durante al menos 4 horas.</p> <p>Si al mismo tiempo también se solicita la prueba de urocultivo, recoger el SEGUNDO CHORRO de orina.</p>

Fecha emisión	Título Documento	Fecha revisión	Número Revisión	Página
27/12/2023	Recogida de muestras microbiológicas de usuarios (DI 2779)	06/02/2024	01	16 di 19