

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Brianza

STRUTTURA COMPLESSA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA
ASST VIMERCATE
DIRETTORE DOTT.SSA LOREDANA GIACOMANTONIO

Istruzioni per le donne sottoposte a trattamento chirurgico per Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG)

Gentile Signora,

nei prossimi giorni potrà avere delle perdite di sangue (in genere più scarse di una mestruazione) che potrebbero persistere per alcuni giorni (anche 10-15 giorni) e poi diminuire gradualmente d'intensità; potrebbe anche avere dei modesti dolori simil-mestruali e un lieve rialzo febbrile (<38)

Qualora le perdite ematiche fossero molto abbondanti, la febbre alta (>38) o i dolori molto forti è meglio che si rivolga al Pronto Soccorso di quest'Ospedale per una visita ginecologica di controllo.

Nei primi 15 giorni dopo l'IVG è consigliato astenersi dai rapporti sessuali; il flusso mestruale si presenterà dopo circa 30-40 giorni dall'intervento ed è preceduto da un'ovulazione. E' quindi possibile rimanere nuovamente gravide se non si utilizza sin da subito un contraccettivo alla ripresa dei rapporti sessuali.

Dopo circa un mese dall'intervento è consigliabile eseguire un controllo ginecologico per assicurarsi che non ci siano complicazioni e per controllare il dispositivo intrauterino, nel caso sia stato inserito nel post intervento, oppure sarà l'occasione per valutare con il medico quale metodo contraccettivo utilizzare a partire dalla prima mestruazione successiva all'IVG.

Il controllo ginecologico può essere fatto presso l'ambulatorio divisionale dell'Ospedale (previo appuntamento da prendere al CUP), presso il consultorio o presso il ginecologo di fiducia.

Le rammentiamo che deve andare a casa accompagnata perché è assolutamente sconsigliabile mettersi alla guida di un veicolo dopo l'anestesia.