

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Brianza



Dipartimento materno infantile

Struttura Complessa Ostetrica e Ginecologia
Ospedale di Vimercate
Struttura inserita nella rete formativa
Università Statale degli Studi di Milano Bicocca
Scuola di Specializzazione in Ostetricia e
Ginecologia

Direttore:

Dott.ssa Loredana Giacomantonio
Tel. 039 6657393

Coordinatore Infermieristico:

Sabrina Trombetta
tel. 039 6657412

Coordinatore Ostetrico:

Michela Ramunno
tel. 039 6654671

INDICAZIONI DOPO CONIZZAZIONE CERVICALE (LEEP)

Gentile Signora, in data odierna è stata sottoposta ad un intervento che prevede l'asportazione di una lesione del collo dell'utero. Di seguito troverà delle informazioni utili relative all'intervento eseguito e ai futuri controlli.

Il giorno stesso dell'intervento è consigliabile riposare mentre le abitudini quotidiane possono essere riprese già dal giorno successivo.

Tuttavia, nelle prime 3 settimane dopo la conizzazione, si consiglia di:

- non utilizzare assorbenti interni o lavande vaginali;
- evitare rapporti sessuali;
- evitare bagni in piscina/mare.

Perdite vaginali bruno-giallastre o perdite ematiche modeste sono considerate normali nelle prime 2-3 settimane dopo la conizzazione.

Il ciclo mestruale successivo all'intervento può essere più abbondante del solito. A volte, inoltre, può verificarsi una perdita ematica abbondante a distanza di circa 10-20 gg dalla conizzazione, legata alla caduta dell'escara. In caso dovessero verificarsi perdite ematiche a carattere emorragico, è necessario recarsi presso il pronto soccorso ginecologico (< dell'1% dei casi).

L'esame istologico Le sarà consegnato **personalmente** da un medico ginecologo presso l'ambulatorio di colposcopia (ambulatorio 8, 1° piano) **venerdì _____ ore 11.40 – 12.40**, (per conferma telefonica chiamare il n° 039/6657438 al mattino). **Si ricorda di portare la lettera di dimissione e la documentazione precedente.**

Anche se nella maggior parte dei casi la conizzazione permette di rimuovere completamente la lesione cervicale, esiste la possibilità che alcune lesioni permangano in parte o si ripresentino successivamente. **Per questo è fondamentale eseguire i controlli periodici**, secondo le indicazioni fornite alla consegna dell'esame istologico. Solitamente il primo controllo viene programmato a 6 mesi dalla LEEP con PAP test, HPV test e colposcopia.

Nelle donne con displasia cervicale moderata/severa (CIN2-3 - HSIL) è raccomandata la vaccinazione anti-HPV. La 1° dose viene proposta contestualmente alla conizzazione, mentre le dosi successive possono essere prenotate gratuitamente nei centri vaccinali di riferimento per residenza (necessaria documentazione attestante la diagnosi). Per le donne residenti nel territorio di ASST Brianza è attivo il link di prenotazione <https://sv.asst-brianza.it/>

In caso di urgenza o per necessità di chiarimenti, contattare l'ambulatorio di colposcopia (039/6657218) il venerdì mattina o il reparto di Orchidea (039/6654636).