

*ANCHE SE SEI VACCINATA RISPETTA
COMUNQUE I CONSIGLI SUL
DISTANZIAMENTO SOCIALE*

Fonte: documento sulla vaccinazione anti-Covid-19 elaborato dal Comitato Percorso Nascita e Assistenza Pediatrica e Adolescenziiale di Regione Lombardia.

Per saperne di più:

- regione.lombardia.it
- saperidoc.it
- epicentro.iss.it
- salute.gov.it

Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Brianza

Dipartimento Materno Infantile
U.O. C. Ostetricia e Ginecologia
U.O.C. Pediatria e Neonatologia
Asst Brianza

MAMMA ANCHE TU PUOI VACCINARTI!!

*LA VACCINAZIONE ANTI-COVID19
IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
E' SICURA!*



La vaccinazione anti Covid-19...

- ✓ È **raccomandata** nel 2° e nel 3° trimestre di gravidanza. È possibile ricevere la vaccinazione anche nel 1° trimestre in base alla valutazione del proprio medico di fiducia.
- ✓ **Non è necessario un test di gravidanza** per somministrare il vaccino.
- ✓ È raccomandata anche **durante l'allattamento** materno, che va promosso e sostenuto e non interrotto.
- ✓ È raccomandata **anche alle donne che hanno già avuto la malattia**.
- ✓ **Non è necessario un tempo di attesa** nella ricerca di una gravidanza dopo la vaccinazione.
- ✓ Per ragioni di farmacovigilanza si raccomanda di **distanziare di 14 giorni** la vaccinazione anti-Covid-19 da altre eventuali vaccinazioni (es. la vaccinazione anti-pertosse che si esegue nel 3° trimestre).
- ✓ Durante il trattamento di **procreazione medicalmente assistita** i professionisti sanitari consiglieranno il momento migliore per ricevere il vaccino.

Perchè vaccinarsi in gravidanza e allattamento?

- ✓ È raccomandato effettuare la vaccinazione anti-COVID19 in quanto protegge la salute della mamma, quella del bambino, della famiglia e della comunità.
- ✓ Se hai dubbi è importante chiedere informazioni sulla sicurezza del vaccino in gravidanza e sul rischio individuale di sviluppare una malattia grave da SARS-CoV-2 al ginecologo, al neonatologo-pediatra o al medico di medicina generale.
- ✓ Se stai pianificando una gravidanza, non è necessario ritardare la somministrazione del vaccino.
- ✓ Sono raccomandati i vaccini mRNA (Pfizer-BioNTech o Moderna che non contengono virus vivi) dei quali è confermata efficacia e sicurezza in gravidanza e in allattamento. Possono avere effetti collaterali lievi, come febbre o dolori muscolari, della durata di un giorno o due. Gli anticorpi sviluppati dal vaccino sono protettivi contro l'infezione anche per il neonato
- ✓ La vaccinazione anti-Covid-19 è raccomandata in modo particolare alle donne in gravidanza con obesità, diabete, età superiore ai 35 anni o altri fattori di rischio elevato di contrarre l'infezione da SARS-CoV2, nonché per le donne che svolgono una professione socio-sanitaria.
- ✓ Non ci sono prove che i vaccini anti-Covid-19 influenzino la fertilità