

## **Contatti per prenotazione**

**Ambulatorio di ostetricia 6° piano**

**Telefono: 0362 385635**

**attivo il lunedì e il venerdì  
dalle 9.00 alle 13.00**


## **Contatti per informazioni**

**Ambulatorio di ostetricia 6° piano**

**Telefono:**

**0362 383460**

**attivo dal lunedì al venerdì  
dalle 14.00 alle 15.30**



**PERCORSO DI DIAGNOSI  
PRENATALE**  
**una scelta consapevole**

**Ospedale Pio XI - Desio**

## Perché scegliere (o no) la diagnosi prenatale?

Il 97% dei bambini non presenta problemi congeniti, tuttavia è importante ricevere tutte le informazioni necessarie per scegliere in modo consapevole se eseguire quei test finalizzati a dare informazioni sull'eventuale presenza di malformazioni nel vostro bambino prima della nascita.

## Come prenotare la diagnosi prenatale

*prenotazione telefonica al numero 0362/385635 attivo il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00*

## Dove

- prelievo ematico al 1 piano - laboratorio
- ecografia translucenza: 3 piano - ambulatorio ostetrico, dopo aver fatto l'accettazione al CUP al piano terra

## Occorrente necessario

- impegnativa per prelievo venoso per "B-HCG e PAPP-a" da eseguire tra 10 e 11 settimane gestazionali
- impegnativa per ecografia con dicitura "studio della translucenza nucale", con esenzione; da eseguire tra 12 e 13+4 settimane gestazionali
- ecografia di datazione (1 trimestre), con data presunta del parto confermata.



**Dipartimento Materno Infantile  
UOC di Ostetricia e Ginecologia**

## Le tappe della diagnosi prenatale

### Esito e referto del test combinato

Subito dopo l'esame ecografico, se il prelievo è stato effettuato in precedenza. Il test identifica 8-9 bambini su 10 affetti da sindrome di Down.

### Se "basso rischio"

Il risultato del test indica un ricalcolo del rischio per trisomia maggiore di 1:1000 (es 1:1500)

### Se "intermedio rischio"

Il risultato del test indica un ricalcolo del rischio per trisomia compreso tra 1:300 e 1:1000 (es 1:600)

### Se "alto rischio"

Il risultato del test indica un ricalcolo del rischio per trisomia superiore a 1:300 (es. 1:100)

### Ricerca del DNA fetale

Prelievo venoso materno su cui si misura la quantità di frammenti di DNA fetale e circolanti nel sangue materno. Questo esame identifica il 99% dei bimbi affetti da sindrome di Down e 8-9 bimbi affetti da trisomia 13,18. Inoltre, permette l'analisi dei cromosomi X e Y offrendo una precisione maggiore del 99% per la determinazione del sesso.

L'esame è gratuito solo se il test combinato ha un esito di "alto rischio" o "rischio intermedio", diversamente le spese sono a carico dei genitori.

Si esegue dalla 10° settimana di gravidanza.

L'esito viene comunicato dopo 15 giorni dal personale ambulatoriale.

### Amniocentesi e Villocentesi

Esame invasivo, che viene eseguito, dopo consulenza col medico ginecologo presso Hub ostetrico di riferimento

### Eco ostetrica di II livello o pre-morfologica

Ecografia eseguita tra 16 e 18 settimane; si studia l'anatomia del feto per escludere anomalie già diagnosticabili a quest'epoca.